

Lesiones Benignas de la mama

TUMORES BENIGNOS DE MAMA

ADENOMA EN EL PEZÓN	¿QUÉ ES?	¿QUÉ ES?	CLASIFICACIÓN
También enfermedad muy poco común, el adenoma del pezón se pone de manifiesto (entre los 40 y 50 años) como un pequeño nódulo de mayor 10 mm en el tejido del pezón que simula el de la areola. El nódulo ulceró el pezón y sangra con facilidad, por lo que obliga al diagnóstico diferencial con el cáncer de Paget.	Los principales tumores encontrados dentro de los comportamientos clínico-generales acuden por ser nódulos en general, consultado por mujeres jóvenes, de crecimiento, lento y no crecen más allá de 4 cm, son asintomáticos, no invaden los tejidos circundantes y son muy raros después de los 50.	Los principales tumores encontrados dentro de tejido (fibroadenoma, papilares, adenoma del pezón) y no epiteliales.	Los tumores benignos pueden clasificarse según el tejido (fibroadenoma, papilares, adenoma del pezón) y no epiteliales.
DX Y TX.	TX: SIEMPRE ES QUIRÚRGICO	CLASIFICACIÓN	TN SE Y OTROS
Diagnóstico: Es sencillo cuando el tumor es palpable y se origina en el pezón, sale un derrame serosanguinolento por el ducto. No, obstante, aunque los adenomas nunca suelen alcanzar un tamaño significativo, en los márgenes medios y solo la biopsia lo confirmará. Tx: Siempre es quirúrgico.		Los tumores benignos pueden clasificarse según el tejido (fibroadenoma, papilares, adenoma del pezón) y no epiteliales.	Los tumores benignos pueden clasificarse según el tejido (fibroadenoma, papilares, adenoma del pezón) y no refutales.
TUMORES PAPILARES	TUMOR PHYLLODES	TUMOR PHYLLODES	FIBROADENOMA
El signo más eficaz es el derrame por el pezón, el más común en masas o masas que se encuentran en el sistema incongruentes. Estos son benignos y es siempre recomendable realizar una biopsia del tumor determinando ser el tratamiento apropiado.	- Aunque raro, el tumor phyllodes (T Ph) tiene correspondencia por ser las neoplasias más comunes de estroma en mujeres adultas. presentarse como masas firmes, móviles, indoloras y sin más. - Diagnóstico por ecografía mamográfica y como exclusión neoplasia circunscrita.	- Aunque raro, el tumor phyllodes (T Ph) tiene correspondencia por ser las neoplasias más comunes de estroma en mujeres adultas. presentarse como masas firmes, móviles, indoloras y sin más. - Diagnóstico por ecografía mamográfica y como exclusión neoplasia circunscrita. Tx: Exéresis del tumor	El fibroadenoma de mama (FA) es el tumor más común y también es el más común en mujeres jóvenes. El FA aparece entre los 15 y 50 años como una masa de 1-3 cm, indolora, firme y móvil. Macroscópicamente si el FA es persistente o crece rápidamente, se biopsia para determinar el tratamiento.
		FIBROADENOMA Elia: biopsia y tucor del. lo. y paret der, sar, mor, finmos. Tx: Mayora despues por: lbe: ys ytedes. Inmunoterapia, tor circunscrimed.	