

Pancreatitis aguda y crónica

PANCREATITIS

Es una inflamación del páncreas que se presenta en dos formas: aguda y crónica, y puede deberse a edema, necrosis o hemorragia.

ETIOLOGÍA:

ALCOHOL:

- Consumo continuado/una sola ingestión
- Efecio toxico directo alteraciones del EO,
- Aumento de la permeabilidad del conducto

HIPERTRIGLICERIDEMIA

- Tg>500-1000mg/dl
- Interferencia con determinaciones analíticas

HIPERCALCEMIA:

- Activación tripsinógena/Depósito del calcio
- Hipertiroidismo, Metástasis óseas, CCV

Otras causas de obstrucción de Ampolla de váter:

- Tumores de la zona hepatopancreática
- Divertículos periampulares y duodenales

CAUSAS CONTROVERTIDAS:

- Páncreas divisum
- Fracaso de la fufn vertebral/dorsal
- Hipertrofia papilla de Aquar,
- Disfunción del esfínter de Oddi.

Cálculos biliares: Barro biliar y microcalculi

- Impacción en la ampulla de Vater
- Mayor riesgo con cálculos <5mm
- Rscan necurriencos de destrucción y rerulgo-derra/vmicrocalculi.

INFECCIONES Y TOXINAS:

- Virus, hongos, bacterias, parásitos.

FÁRMACOS:

- Por reacción alérgica o toxicidad directa
- indistinguible. Buen pronostico

ANATOMÍA PATOLÓGICA:

PA edematosa o intersticial 80%

- Mayor frecuente. Buen pronostico, picior.
- Páncreas tuneíaco o brillante.,
- Congestión vascular, edema e infiltración de PMN.

PA necrohemorrágica 20%

- Mayor gravedad (Mortalidad 2-10%)
- Desarrolis de necrosis y hemorrhagrás en pancreas.

